

## FICHE D'INFORMATION et CONSENTEMENT

### PLEUROSCOPIE

Madame, Monsieur,

Vous allez bénéficier d'une pleuroscopie.

#### Principe :

La pleuroscopie est un examen qui se pratique au bloc opératoire sous anesthésie générale. Elle est indiquée si vous souffrez d'une maladie de la plèvre : pleurésie (présence de liquide dans la cavité pleurale, espace entre le poumon et la cage thoracique) ou d'un épaissement pleural. Elle permet non seulement de faire le diagnostic de votre maladie, mais aussi, dans certains cas, de limiter la récurrence de l'épanchement (talcage).

#### Avant l'examen

- ✚ vous devrez rencontrer le médecin anesthésiste quelques jours avant l'intervention
- ✚ vous serez hospitalisé(e) la veille de l'intervention. Il vous sera demandé de prendre une douche avec une solution anti-septique, un rasage du thorax et de l'aisselle sera effectué
- ✚ une prise de sang sera réalisée, les traitements anti-agrégants et anti-coagulants devront être préalablement interrompus par sécurité, avec l'accord de vos médecins
- ✚ il faudra rester à jeun à partir de minuit la veille de l'examen

#### Comment se déroule l'examen ?

- ✚ vous devrez enlever vos bijoux, lunettes et appareils dentaires avant d'être amené au bloc opératoire ;
- ✚ vous serez endormi par un médecin anesthésiste, puis couché sur le côté. C'est un pneumologue qui réalise la pleuroscopie
- ✚ en général, deux petites incisions sont réalisées. Un appareil optique est introduit par l'une des incisions, ce qui permet de visualiser la plèvre. Des fragments de plèvre sont prélevés si nécessaire, à l'aide d'une pince introduite par l'autre incision. En cas de pleurésie récidivante ou de pneumothorax, du talc est pulvérisé sur la plèvre afin de recoller le poumon, ce traitement est efficace dans 80% des cas
- ✚ en fin d'intervention, un drain est posé dans l'une des deux ouvertures (l'autre ouverture étant suturée)
- ✚ à la fin de l'intervention, vous serez conduit en salle de réveil avant de regagner le service de Pneumologie.

#### Après l'examen

- ✚ le soir de l'intervention, vous pourrez prendre un repas léger
- ✚ une réaction fébrile est possible et normale
- ✚ le drain restera en place pendant une durée variable de 3 à 10 jours, selon les cas. Ce drain permet l'aspiration continue du liquide produit par votre plèvre, ou d'air. La présence du drain peut être parfois douloureuse, des médicaments contre la douleur pourront vous être prescrits
- ✚ il vous sera demandé de participer activement aux exercices respiratoires proposés par le kinésithérapeute, afin de favoriser le recollement du poumon

#### Risques éventuels de complications

Tout acte médical, même conduit dans des conditions de compétences et de sécurité conformes aux données de la science recèle un risque de complication. Cependant, si cet examen vous est proposé, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution équivalente. Le bénéfice attendu est largement supérieur au risque encouru.

Je soussigné(e), Monsieur, Madame..... atteste avoir reçu toutes les explications concernant la pleuroscopie. J'ai lu et compris le document d'information, de recommandation et de consentement qui m'a été remis et j'ai reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j'ai posées.

Fait à ....., le ..... Signature : .....